

Enfermedades que se previenen con la vacunación Felina

Enfermedad	Síntomas	Transmisión	Prevención (Vacuna)	Edad de Vacunación	Pronóstico sin Vacuna
Rinotraqueitis Viral Felina (Herpesvirus Felino - FHV-1)	Estornudos, secreción nasal y ocular, fiebre, letargo, úlceras en la boca.	Contacto directo con secreciones de gatos infectados.	Trivalente Felina (FVRCP)	6-8 semanas + refuerzos	Puede volverse crónica, con recaídas frecuentes. En casos graves, neumonía y muerte en gatitos.
Calicivirus Felino (FCV)	Úlceras en la boca, fiebre, secreción nasal, cojera transitoria, neumonía.	Contacto con saliva, secreciones o superficies contaminadas.	Trivalente Felina (FVRCP)	6-8 semanas + refuerzos	Puede causar neumonía severa y afecciones orales crónicas.
Panleucopenia Felina (Moquillo Felino - FPV)	Vómitos, diarrea severa, fiebre alta, deshidratación, pérdida de apetito.	Contacto con fluidos, heces o superficies contaminadas. Altamente contagiosa.	Trivalente Felina (FVRCP)	6-8 semanas + refuerzos	Mortal en gatitos. En adultos, puede causar daños en el sistema digestivo e inmunológico.
Rabia	Cambios de comportamiento, agresividad, salivación excesiva, convulsiones, parálisis.	Mordeduras de animales infectados. Zoonótica (puede transmitirse a humanos).	Vacuna Antirrábica	12-16 semanas + refuerzo anual	Mortal en todos los casos.
Leucemia Felina (FeLV)	Pérdida de peso, infecciones recurrentes, anemia, debilidad.	Contacto con saliva, orina o sangre de gatos infectados.	Vacuna FeLV (Opcional)	9-12 semanas + refuerzo	Sin tratamiento, causa inmunosupresión severa y muerte prematura.
Peritonitis Infecciosa Felina (PIF)	Pérdida de peso, fiebre persistente, abdomen hinchado, problemas neurológicos.	A través de heces contaminadas con el coronavirus felino mutado.	Vacuna PIF (Opcional)	16 semanas (según recomendación veterinaria)	Mortal en la mayoría de los casos. No tiene cura efectiva.
Inmunodeficiencia Felina (FIV - "SIDA Felino")	Infecciones recurrentes, debilidad, pérdida de peso, enfermedades bucales.	Mordeduras profundas de gatos infectados.	Vacuna FIV (Opcional)	16 semanas (según exposición al riesgo)	Enfermedad crónica sin cura. Reduce la esperanza de vida.
Clamidia Felina	Conjuntivitis, secreción ocular y nasal, fiebre, dificultad para respirar.	Contacto con secreciones oculares y nasales.	Vacuna Clamidia (Opcional)	9-12 semanas + refuerzo	No suele ser mortal, pero puede causar problemas respiratorios recurrentes.